

**DE ECLAMPSIA  
INFANTUM  
DISSERTATIO  
INAUGURALIS  
QUAM...**

---

Luigi medico Zanchi (medico),  
Theodore Helm



Med. 87

DE  
**DELAMPSIA INFANTUM**

*Dissertatio Inauguralis*

QUAM

CORPUS ET AUCTORITATE PERILLUSTRES DIRECTORIS  
AC PRÆFIDEI FACULTATIS MEDICÆ SPECTABILIS DOMINI  
BEATI DEI PONT. CLARISSIMORUM D. D. PROFESSORUM ET  
DOCTORIS MEDICINÆ LAUREA SUMMÆQUE IN MEDICINA  
HONORIS AC PRIVILEGII RITE CONSEQUENTIS IN  
ANTIQUISSIMA AC CELEBRATISSIMA UNIVERSITATE TICHINENSIS

AUSPICIO

**D. DOCTORE THEODORO HELM**

*Clinicæ Medicinæ Therapiesque Specialis Prof. P. O.  
Directore Ratisconii Universitatis etc. etc.*

UNA CUM THESIS DEFENDENDIS

Mense Januarii 1845

PUBLICAE INQUISITIONI OFFERENT

**ZANCHI ALOYSIUS**

*BERGOMENSIS.*

---

TICHINENSIS REGII

*Ex Typographiæ Fusi et Socii.*





ALL' AMATISSIMO ZIO

occo rata

OTTIMO PER COLTA MENTE

INDOLE BENEFICA

PEGGIO DI STIMA ED AFFETTO

QUESTO TENUE LAVORO

INTITOLA L' AUTORE

## DEFINITIO.

—————

**E**clampsiae nomine venit morbum illud nervosam infantibus pariterque infensam, quod manifestatur convulsionibus universalibus conscientiae abolitione et per accessus recurrit.

Morbus hic infantes vel ex improviso adoritur, vel prodromis quibundam symptomatibus se se annuntiat. Prodroma haec quandoque per paucos solum minuta, alias per horas, per dies quandoque durantis adnotantur: inquietudo, perterritum, ejulatus, appetitus imminutus, nausea, vomitus aliquando, rabinde tormina, diarrhoea cumcrementis viridibus vel nigrescentibus, nonnulla vice alvas obstipata, temperatura universalis adausa vel imminuta. Cutis color a normali aberrans, singularis pallor, interdum rubor et turgor praecipuus faciei.

Pluries vero Eclampsia infantem vel puerum corripit de repente quin prodroma antecedant, et tunc motus insolentariū convulsivi, muscutorum faciei, palpebrarum et maxillae inferioris observantur et spuma exprimitur later labii oris. Exagitantur musculi extremitatum tam superiorum quam inferiorum, corripuntur spumae et illi dorsi, ideo corpus esse vario contorquetur modo. Respiratio eradit strepitum anhelum et non raro involuntarie et laede excrementa et ejulant. Vires, auditus, tactus torpent tali modo, ut nihil viderent, nil audiant, nihil percrentiant. Univerſa cutis illa praecipue faciei sub convulsionis accessu ruberrima eradit, subinde livida, saepe tumori ubi insultus per aliquot protrahitur tempus cutis pallescit ac si corpus sistat exangue. Non raro sub circumstantiis hujusmodi involuntarie contingit evacuatio urinae alvique excretio.

Talis perdurat insultus quandoque tantum per pauca minuta, saepe per horas quadraginta, per horas aliquando, imo per diem, duos trese, ita ut spumae remittant quidem et percreas silent, verum rursus revertantur et corpus exagitant tenellum. Interdum unum solummodo exagitur corporis latus alterum immobile quasi paralyticum. Eradito convul-

siculis secum plurimi infantes in aopærem incidunt per horas نومالاس , dein ad mentem redacti ignorantiam de evento ostendere videntur.

## CAUSÆ.

Inter causas Echampiæ disponentes, omnium Medicorum consensus sequentes numerantur. Dispositio quaedam hæreditaria a parente alterutro spasmis hysteriæ vel epilepsiæ obnoxia. Aliæ Parentibus cæterisque senis, per influxus noxios in Matrem tempore gestationis agnitas, imprimis Fetus dispositio ad Echampiæ. Inter hujusmodi influxus animi pathemata peculiariter merentur considerationem, nec non improvisas sensationes a terrore inductas.

Peculiaris porro natura ad hunc morbum observatur dentitionis periodo, quo tempore major sanguinis congestio in caput universum et encephalon locum habet. Echampsia autem semel exantlata, dispositionem in eandem morbum relinquit.

Causæ morbum hujusmodi excitantes multiplices erant. Frequenter saburra gastrica in infantibus Echampiæ provocat. Sic in neonatis a meconio nimis quantitate retento morbus

dictas producit. Ita lac maternum aut nutritricis copia majori ingestum, adhuc frequenter lac corruptum sistit infantibus convulsivæ causæ. Corruptio vero lactis inducitur, nunc per cibos vel potus incongruos, quibus uatrî largiebatur, nunc per morbos in eadem evolutos, frequenter per animi affectus vehementiores, præcipuè iram, per tristitiam etiam nec non per desideria non adimpleta. Lactis aberrans qualitas non semper sensibus agnoscenda, ventriculus adhuc tenellus, et gastralgiam, enteralgiam, coæsiem, diarrhoeam, non modo inducit, verum etiam et convulsiones. Præterea alimenta quaecumque salutaria licet, sed nimis quotiesse ingesta, adhuc magis cibi duri, pingues, facultati digerenti obnoxii in prædispositis convulsionem inducant. Subinde potus spirituosus eundem provocat morbum, nec oblivioni sunt recensenda osculla pharmaca incaute exhibita uti hyosciamus, cicuta, belladonna, opium. Causæ vero convulsivæ frequentissimæ evadunt infantibus vermes intestinales, et quidem tam ascarides vermiculares ac lambricoides quam tænia ipsa quæ licet frequentius adultorum intestina inhabitet, tamen in infantibus etiam reperitur. Excitantur porro convulsiones per violentias mechanicas capiti



vel spinæ dorsi illata, per prolapsus per hernias per nimis profusiva. Causa credit aliquando morbi latius refrigerium ipsam, animi quoque affectus eodem habent effectum.

Sir observavit Tissot « infantem trium annorum ex ira epilepticum factum. Idem narrat de puero qui cum alio videret hystericum adinstar ledatos, terrebatur, mox convulsibus expertus in convulsionem incidit debilitatem per diarrhoeam effraenam supervenientem, tandem aliquot post dies convulsus ». Hoffmann hystericam refert de puero, qui spectum conspexisse eum crederet, hoc perterritus fuit ut cadaveris adinstar hucni procumbere, diu expertus, delirium et maxima debilitate, quas convulsiones vehementes sequentes sunt vitam amisit. Wan-eideten infantem, dicunt, quendam, per caecum eum adprehensum, ita stupefectum, ut mox convulsione laboraret per convulsus caecum latratum facillime revocandis.

Non raro Eclampsia infantilis symptomatice excitatur uti febris intensioris continuæ vel intermittentis symptoma. Sæpiusque sub studio eruptionis variolarum, morbillorum et scarlatinae adparet, ita encephalitis, myelitis, hydrocephali, hydrochachiae symptoma constituit.

Excitantur sabinde convulsionem infantum antagonisticam metastaticam, erisipelatam, Unca crusta lactea, cito evacuita.

Ex dictis hucusque, non difficile est intellecta differentiam Eclampsiae ab auctoribus statutas, uti essent: Eclampsia protopathica, dentropathica, gastrica saburralis, mucosa, biliosa, verminea, inflammatoria, nervosa, sympathica, symptomatica, antagonistica.

### PROGNOSIS.

Pro varia Eclampsiae natura, prognosis quoque variare debet. Generationem morbus iste pertimescendus, non paucos infantes spatia duodecim aut viginti quatuor horarum evocat. In cadaverum autem ut plurimum reperitur signa congestione sanguinis in Encephalo, vel medulla spinali, nec non parva seri quantitas pariter in cavo cranii et specu vertebrae. Non omnis tamen Eclampsiae species mortem inducit, imo causa excitante remota, per solas naturae vias non raro devincitur. Sed etiamsi infantes mortem evitare valeant, tamen Eclampsia devicta, sequitur non raro habitus-  
us epilepsia quae dein saepe saepius omni rebellis est therapiae, et etiamsi debellatur pe-

ralysus relinquit atque imbecillitatem. Saepe tamen per therapiam rationalem Eclampsia infans felicius habet terminosorem.

## CURA.

Tempore insultus, vestimenta omnia corpus arctius constringentia, solvenda sunt, infans debili modo disponendus, ne forte e lecto excidat, aut per motus vehementiores convulsi-vos, aliquam laedat corporis partem. Deinde adstantium narratione, et congrua nentes investigatione constatur, naturam morbi individuum deficere, et hinc adequatam opponere medendi methodum. Si deglutitio plane esset interclusa ac nulla interne pharmaca suppeditari possent, cura remedia tantummodo externa adplicita, absolvi deberet.

Quibus in quibus ex symptomatibus et investigatione convincitur, causam proximam morbi, sanguinis esse in Enecephalo congestionem aut medulla spinali, indicatio elucet ad hanc congestionem leniendam. Quamobrem periculis evadit frigoris adplicatio ad caput, et seria respiratio liberi atque frigidiusculi, et nos vero hoc simplicissimo remedio, Eclampsia sub paroxysmo febili, sub eruptione va-

riolarum et morbillorum incedens, feliciter evadit.

Ubi morbus internus manifestatur, depletio sanguinalis indicatur tempore insultus instituenda, spe hirudinum ad regionem temporalem vel occipitalem, et aspersione tempore quo sugunt hirudines, jam spem remittent jam deparent.

Cum vero tam ex symptomatibus quam ex indole potentiarum necotium intelligimus; veram Eclampsie causam esse, veram debilitatem crebaticam, tunc linteas calefacta ferro aromatico imbuta, erunt ceteri adplicanda, et fomenta aromatica-vinosa cum spiritu aromatico, spiritu vini camphorato etc. propriis abdominali imponenda, et ipsum abdomen nec non spina dorso unguentis stimulantibus est inungenda. Aetheres sulfurici, spiritus salis ammoniaci, balsamum quoque peruvianum optime ducunt. Ubi haec non sufficiant, ad siropiosos confugiendum, et elixirata ex infuso Heram chamomillae, radice valerianae sylvestris cum ana-fœtida et spiritu corui cervi. Si omnia quae diximus non valent convulsionem sistere vel imminuere, balneo tepido ex aqua communis, additis herbis aromaticis ac vino, per quadrantem horae infantem admitti, perhibito conspersi.

Insiduo superato, ad præcavendum reditum therapia pro diversitate causarum et diverso morbi characterè, diversa requiritur. Si si causa spasmodum fuerit saburra vel in ventriculo vel in tubo intestinali ingenerata, evacuationis indicantur et antispasmodica. Si Naturæ viribus vomitum habens vel diarrhoea, evacuationes istae hoc caso minime suppressendae, conjungendae sunt potu tepidulo infusi florum tili atque verbasci; si natura infirma evadit, debemus pro diversa saburrarum ratione, vel purgantia vel emetica vel antihelmintica exhibere.

Dem indicatio pro emetico adert, pluribus in casibus tartarus stibi cæteris antecellit emetica. Solvimus tunc granum novum in aqua distillatæ uccis una, et cochlear coffeæ cum exhibemus omni quadrante horæ donec vomitus exurgat. Saburræ deorsum tergitem, quandoque jam clysmata evacuant. Adhibemus tunc aquam tepidam cum butyro, vel oleo, vel saccharo, vel melle, et his non sufficientibus addimus clysmati salem communem, vel anglicum. Sed frequentius purgantia interne sumpta magis præstant. Hoc scopo præscribimus infantibus syrupum diarrhoei cum rheo vel mannâ, et porrigitur omni hora co-

chlearia duo, donec binæ ternæ subsequantur evacuationes. Aetate majoribus, alioque pertinaciter obstipata existente, quod frequenter evenit data saburra mucosa et vermicosa adest, purgantia conveniunt effusiora. Sic folia senecæ, acetum duplicatum, radix jalapæ et calomel forma et dosibus unicuique notis optime ducunt.

Non raro saburra licet evacuata, adhuc impermanet eisdem primarum viarum, et tunc sic dicta absorbentia valdeperere possunt qualia sunt; carbonates huius magnesiæ et sodæ. Postmodum ad secretiones viarum digestiviarum corrigendas et vim digestivam promovendam, amara remedia et aromatica, uti calamus aromaticus, cortex aurantiorum, semina fœniculi et anisi, perutilia sunt.

Quando morbus characterem ostendit energicum, superato etiam insultu, methodus antiphlogistica non negligenda, jam minor jam intensior per circumstantia. Huc præter vitæ regimen negativum, nitrum, aromorem tartari, tartarum tartarizatum, protodioruretum hydrargyri, nequaquam et fœnestorum frigidiorum, nec non hirudinum effectum ad mentem habere oportet.

Ubi *Eclampsia* per statum peculiariter abnormali systematis nervosi sustinetur, ibi sic dicta antiepileptica porrigenda sunt, quarum precipua sequentia enumerantur: radix *ipecacuanhae* refracta dosi exhibita vel forma pulveris vel infusionis; flores *zinci* ut remedium antiepilepticum et anthelminticum, ad granula semis tenuis, ad grana duo et quatuor adultioribus exhibendum pro *mythenore*. Radix *valerianae sylvestris*, quae gaudet virtute spasmos solvendi, et vermibus adversa. Spiritus cornu cervi simplex vel succinatus, ad guttas adhibitus, vel in coarctio cum radice *valerianae* aut herba menthae. Radix *artemisiae vulgaris* vel pulvere vel infuso, et quandoque ex administratione bufoas pharmaci utrum habemus emolumentum. Sic *Hufeland* refert casum infantis dimidi anni qui jam per duos menses *Eclampsia* deturbabatur rebeli omni medendi methodo jam exhibita, tunc ex pulvere radice *artemisiae vulgaris*, post aliquot dies evanescere omnia convulsiva symptomata, morbo non amplius recurrente.

Cortex *acantiorum*, herba *menthae crispae*, flores *chamomillae* infusionis forma non raro benedice agunt. Assa foetida vitellum ovorum subacta in clysmate optimum ablit remedium.

Campbore et castoreum infusa utplurimum addantur. Moschas, pharmacum pretiosissimum in Eclampsia infantum, princeps constituit remedium antispasmodicum, et mirabile credita quod infantes magnam hujusce pharmaci dosim perferre valeant ita et ad gramam unam et ultra exhiberi possit omni hora.

Casibus specialioribus, narcotica etiam caute exhibita optime ducant. Sic observatores de hyoscyamo et opio.

Quando morbum nostrum convalescentem febres comitatur intermittentes, medendi methodus convalescenti institienda venit, et cortex peruvianus ejusque preparata, hiis in casibus sunt consulenda. Porro diversi chininae sales uti sulfas, acetas, citras, magnam adferre possunt utilitatem, et diversimode cure confici potest, vel interne subministrando, vel methodo tadernica, brachia vel regioni epigastricae, dicta pharmaca applicando.

Si vero Eclampsiam symptoma habemus alterius morbi gravioris uti encephalitis, myelitis, idrocephali, hydrocephali, tunc morbus protopathicus principalem in cura requirit considerationem.

Sub reconvalescentia, ad morbi recidivam preventandam, singularem attentionem requi-



sunt causae individuales, quae morbum via excitatum excitare valuerunt et hisce convenienti obveniendum est modo. Postea insigilet Medicus ut tractamen ulterius et vivendi genus, characteri morbi progressui, complicationibus concomitantibus, et adfectionibus forsitan relictis conveniens sit.

FINIS.

*THESES DEFENDENDÆ.*

## I.

Sine china, opio, et mercurio nollem  
esse Medicum.

## II.

Ventriloques non ventre loqui.

## III.

Hæmoptoes diaguosisim, interdum summe  
difficilem.

## IV.

Preparata Martis omnino deprimentia  
declaranda sunt.

## V.

**Frigus minime antisepticum sed depri-  
mens.**

## VI.

**Helminthiasis morbum in pueris frequen-  
tissimum.**

## VII.

**Chlorosis, nisi lentam angustidem.**

99 739349